

GASTEROXIN FORTE

Gasteroxin Forte kann therapiebegleitend bei Ulcera Problemen, Magenschleimhautveränderungen und allgemeinen Verdauungsproblemen infolge von Stressreaktionen, Umstellungen oder Leistungsdruck eingesetzt werden. Schleimhautläsionen können sich in kurzer Zeit zu größeren Magen- und Darmgeschwüren entwickeln.

Gasteroxin Forte enthält natürliche schleimhautschützende Substanzen, (Karottenpulver, Zitrustrester) die die Magenschleimhaut des Pferdes unterstützen und eine zusätzliche Schutzschicht aufbauen können. Die Regeneration von Magenschleimhautläsionen kann durch pflanzliche Komponenten wie (Süßholzwurzel, Mariendistelsamen und Traubenkernmehl) zusätzlich unterstützt werden. Pektine aus Karottenpulver, Zitrustrester und Traubenkernmehl bilden eine gallertartige Masse und schützen dadurch die Magenwände. Pre- und probiotische Hefen (Bierhefe, Lebendhefen) unterstützen die Verdauungsvorgänge und bringen das physiologische Darmmilieu wieder in Einklang. Zusatzstoffe, wie Tryptophan und Magnesium Aspartat mit ihren beruhigenden Eigenschaften, vermindern die Stressanfälligkeit des Pferdes und können dadurch Magenproblemen vorbeugen.

Zusammensetzung

Karottenpulver, Zitrustrester, Bananenmehl, Leinkuchenmehl, Mariendistelsamen, Süßholzwurzel (gemahlen), Flohsamenschalen (gemahlen), Magnesiumaspartat, Biertreber (*saccharomyces cerevisiae*), Dextrose, Bierhefe (*saccharomyces cerevisiae*), Mariendistelöl, Traubenkernmehl, Artischockenblätter (gemahlen)

Analytische Bestandteile und Gehalte

Rohprotein 12,00 %, Rohöl und -fette 4,30 %, Rohfaser 9,40 %, Rohasche 6,30 %, Natrium 0,10 %, Feuchtigkeit 4,90 %

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:

Cholinchlorid (3a890) 3.000 mg, L-Tryptophan (3c440) 20.000 mg

Zootechnische Zusatzstoffe:

Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 (4b1710)
15 x 10¹⁰ KBE



Technologische Zusatzstoffe:
Lecithin (E322), Kieselgel (E551b)

Fütterungsempfehlung

Gasteroxin Forte den Futterrationen gut untermischen.

Dosierung

Pferd: 2 x 50 g / Tag

Pony: 2 x 30 g / Tag

Messbecher gestrichen = 50 g.

In einer Akutphase kann die Dosierung auf 3 x 50 g – 3 x 30 g in den ersten Tagen erhöht werden.

Reichweite

Ca. 25 Tage / 600 kg

Handelsform

2,5 kg Dose